

予防接種

【定期予防接種（公費）】

ヒブ、小児用肺炎球菌、4種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、ジフテリア破傷風、子宮頸がん予防

種類	期間	生・不活化
ヒブ (インフルエンザ菌b型)	<p>生後2か月～5歳未満。</p> <p>接種開始月齢により接種回数が異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 生後2か月以上7か月未満 初回3回+追加1回 ■ 生後7か月以上12か月未満 初回2回+追加1回 ■ 1歳以上5歳未満 初回1回 <p>初回接種は27日（医師の判断で20日）以上（標準的には56日までの）間隔をおく。</p> <p>追加接種は初回接種終了後7か月以上（標準的には13か月までの）間隔をおく。</p>	不活化 ワクチン
小児用肺炎球菌	<p>生後2か月～5歳未満。</p> <p>接種開始月齢により接種回数が異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 生後2か月以上7か月未満 初回3回+追加1回 ■ 生後7か月以上12か月未満 初回2回+追加1回 ■ 1歳以上2歳未満 初回1回+追加1回 ■ 2歳以上5歳未満 初回1回 <p>初回接種は27日以上の間隔をおく。</p> <p>追加接種は初回接種終了後60日以上の間隔をおき、1歳以上で受ける。</p> <p>できるだけ生後2か月～7か月の間に接種を開始してください。</p>	不活化 ワクチン
4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)	<p>1期初回</p> <p>生後3か月～7歳6か月未満に20日以上（標準的には56日までの）間隔をおいて3回受ける。</p> <p>できるだけ生後3か月～1歳未満の間に受けてください。</p> <p>1期初回追加</p> <p>1期初回終了後、6か月以上（標準的には12か月～18か月の）間隔をおいて1回受ける。</p> <p>7歳6か月未満が対象です。</p>	不活化 ワクチン
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	<p>2期</p> <p>11歳から13歳未満までに1回受ける。</p>	不活化 ワクチン

<p>麻しん（はしか）・風しん （三日ばしか）</p>	<p>1期 12か月～24か月未満の間に1回受ける。 （なるべく満1歳になると受けるようにしてください） （注）対象期間中に医学的理由により一度も接種機会がなかった方は健康センターへご相談ください。</p> <p>2期 満5歳以上7歳未満で小学校就学の1年前（4月1日）から小学校就学の前日（3月31日）までに1回受ける。 （注）平成28年度（2016年度）の対象者は平成22年（2010年）4月2日～平成23年（2011年）4月1日生まれの幼児 （注）対象期間中に医学的理由により一度も接種機会がなかった方は健康センターへご相談ください。</p>	<p>生ワクチン</p>
<p>水痘</p>	<p>1回目 生後12か月～3歳未満（標準的には生後12か月～15か月まで）の間に1回受ける。</p> <p>2回目 生後12か月～3歳未満で、初回接種終了後3か月以上（標準的には初回接種終了後、6か月～12か月）の間隔をおいて1回受ける。</p>	<p>生ワクチン</p>
<p>日本脳炎</p>	<p>1期初回 生後6か月～7歳6か月未満に6日以上（標準的には28日までの）間隔をおいて2回受ける。（なるべく3歳で受けるようにしてください）</p>	<p>不活化 ワクチン</p>
<p>B型肝炎</p>	<p>1回目 生後2か月から1回受ける。</p> <p>2回目 1回目から4週間おいて1回受ける。</p> <p>3回目 1回目から139日以上（約5～6か月）おいて1回受ける。</p>	<p>不活化 ワクチン</p>